

# Überblick: regulärer Impfplan für Kinder und Jugendliche in unserer Praxis



Wenn eine Mitimpfung der Eltern gewünscht ist (z.B. Influenza; Auffrischung Tdap/ Tdap-IPV ): bitte bei Terminvereinbarung einer Vorsorge/ Impfung für das Kind mit anmelden.

8 Wochen	12 Wochen	16 Wochen	20 Wochen	6 Monate	11 Monate	12 Monate	15 Monate	5 ¼ Jahre
U4				U5	U6			U9
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotavirus</li> <li>DTaP_HepB_IPV +HiB („6-fach“)</li> <li>Pneumokokken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotavirus</li> <li>Meningokokken B</li> </ul> <p>für Frühchen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zusätzlich eine weitere Dosis „6-fach“ + Pneumokokken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>„6-fach“</li> <li>Pneumokokken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningokokken B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(2.Men B, wenn nicht schon zeitiger erfolgt)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>„6-fach“</li> <li>Pneumokokken</li> <li>Masern_Mumps_Röteln (MMR)</li> <li>Varizellen (V) =Windpocken</li> </ul> <p>„6-fach“+ Pneumokokken regulär mit 11 Monaten; 2 Wochen später MMR+V; wenn zeitiger KiTa-Eintritt: dann abweichend</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningokokken C bzw. ACWY*</li> </ul> <p>*wir folgen der Impfeempfehlung der SIKO für Men ACWY- statt „nur“ der Men C Impfung; Impfberatung erfolgt zur U6 (Kostenübernahme nicht durch alle Kassen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningokokken B</li> <li>MMRV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tdap („3-fach“)</li> </ul>

Ab 9.Geburtstag	12-14 Jahre
U11	J1
<ul style="list-style-type: none"> <li>HPV (2 Impfungen im Abstand von 6 Monaten)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tdap-IPV („4-fach“)</li> </ul>

- Impfung gegen FSME ab 1 Jahr möglich (3 Impfungen für Grundimmunisierung; regelmäßige Auffrischimpfungen notwendig)
- Zusätzliche Impfungen für Kinder mit speziellen Grunderkrankungen

**Zusätzlich zu den Impfeempfehlung der STIKO werden von der „Sächsischen Impfkommision“(SIKO) noch weitere Impfungen empfohlen. (!Kostenübernahme noch nicht bei allen Krankenkassen)**

- Meningokokken B Impfung (2 Impfungen im Abstand von mind. 4 Wochen) für bisher ungeimpfte Kinder älter als 5 Jahre (bis 18Jahre)
- Hepatitis A Impfung (2 Impfungen im Abstand von 6-12 Monaten) für Kinder nach dem 1.Geburtstag
- jährliche Impfung gegen Influenza für alle Jugendlichen, Erwachsene und Kinder ab 6 Monaten (bei Kindern unter 9 Jahren: in 1.Impfsaison sind 2 Impfungen im Abstand von mind. 4 Wochen notwendig)