

Überblick: regulärer Impfplan für Kinder und Jugendliche in unserer Praxis



Wenn eine Mitimpfung der Eltern gewünscht ist (z.B. Influenza; Auffrischung Tdap/ Tdap-IPV): bitte bei Terminvereinbarung einer Vorsorge/ Impfung für das Kind mit anmelden.

Einmalige RSV-Prophylaxe kurz vor bzw. in RSV-Saison (ca. Oktober bis April) für alle Neugeborenen und Kinder bis 12 Monate

8 Wochen	12 Wochen	16 Wochen	6 Monate	11 Monate	15 Monate	5 ¼ Jahre
U4			U5	U6		U9
<ul style="list-style-type: none"> • Rotavirus • DTaP_HepB_IPV+HiB („6-fach“) • Pneumokokken • Meningokokken B 	<ul style="list-style-type: none"> • (Rotavirus) <p>für Frühchen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zusätzlich eine weitere Dosis „6-fach“ + Pneumokokken 	<ul style="list-style-type: none"> • Rotavirus • „6-fach“ • Pneumokokken • Meningokokken B 	<ul style="list-style-type: none"> • (Nachholimpfungen) 	<ul style="list-style-type: none"> • „6-fach“ • Pneumokokken • Masern_Mumps_Röteln (MMR) • Varizellen (V) =Windpocken <p>„6-fach“+ Pneumokokken regulär mit 11 Monaten; 2 Wochen später MMR+V; wenn zeitiger KiTa-Eintritt: dann abweichend</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MMRV • Meningokokken B 	<ul style="list-style-type: none"> • Tdap („3fach“)

Ab 9.Geburtstag	12-14 Jahre
U11	J1
<ul style="list-style-type: none"> • HPV (2 Impfungen im Abstand von 6 Monaten) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tdap-IPV („4-fach“) • Meningokokken ACWY

- **Impfung gegen FSME ab 1 Jahr möglich** (3 Impfungen für Grundimmunisierung; regelmäßige Auffrischimpfungen notwendig)

Zusätzlich zu den Impfpfehlung der STIKO werden vom „Beirat Sächsische Impfkommision“ noch weitere Impfungen empfohlen (!Kostenübernahme nicht bei allen Krankenkassen):

- Meningokokken B Impfung (2 Impfungen im Abstand von mind. 4 Wochen) für bisher ungeimpfte Kinder älter als 5 Jahre
- Meningokokken ACWY Impfung für Kinder unter 12 Jahren
- Hepatitis A Impfung (2 Impfungen im Abstand von 6-12 Monaten) für Kinder nach dem 1.Geburtstag
- jährliche Impfung gegen Influenza für Jugendliche, Erwachsene und Kinder ab 6 Monaten (bei Kindern unter 9 Jahren: in 1. Impfsaison sind 2 Impfungen im Abstand von mind. 4 Wochen notwendig)